

ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อ

ผู้ถูกฉีดวัคซีน ยังมีโอกาสรับเชื้อ มีโอกาสป่วย และมีโอกาสแพร่เชื้อ ไปยังคนอื่น ๆ ได้

ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคน ต้องคงมาตรการควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป ทั้งการสวมหน้ากาก รักษา ระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อ ทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ไข้หวัดใหญ่และวัณโรค

ใครควรได้รับวัคซีนโควิด-19

บุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดและ สาธารณสุข ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสโรค และผู้ที่มี โอกาสเป็นโรครุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรค ปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคหลอดเลือด สมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น

ข้อห้ามและข้อควรระวัง

- ผู้ที่อาจเคยมีประวัติแพ้วัคซีน
- หากมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับ ฉีดวัคซีนไปก่อน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อยและไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้



- ผู้ที่ควบคุมโรคไม่ดี เช่น เบาหวาน ความดัน โลหิต สูง เป็นต้น
- เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อย่างรุนแรง

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีด วัคซีนโควิด-19

อาจมีอาการปวด บวม คัน แดงบริเวณที่ฉีด อาการอื่นๆ อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัวหรือมีไข้ได้ ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและสามารถ หายได้เองใน 1-2 วัน



หากมีอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนนี้ควรทำอะไร

หากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่นวิงเวียน หรืออ่อนแรง หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง ควรรีบไปโรงพยาบาลหรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน



การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 (COVID-19)



โดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี